

투약

학/습/목/표

- 약물투여에서 간호사의 역할과 책임을 설명한다.
- 약물의 작용기전과 유형을 설명한다.
- 약물투여 경로별 특성을 설명한다.
- 약물의 용량을 정확히 계산한다.
- 투약을 위한 수칙을 설명한다.
- 경구투약을 정확하게 수행한다.
- 근육주사를 정확하게 수행한다.
- 피하주사를 정확하게 수행한다.
- 피내주사를 정확하게 수행한다.
- 말초정맥 요법을 정확하게 수행한다.
- 중심정맥요법을 정확하게 수행한다.
- 수혈을 절차에 따라 수행한다.
- 국소투약을 절차에 따라 수행한다.

주/요/용/어

- 국소적 투여(topical application)
 근육주사(intramuscular injection)
 길항 효과(antagonistic effect)
 독작용(toxic effect)
 볼점막(buccal)
 부작용(side effect)
 배설(excretion)
 분포(distribution)
 비경구 투여(parenteral administration)
 비처방약(over-the-counter drug, OTC)
 상승작용(synergistic effect)
 생체전환(biotransformation)
 설하(sublingual)
 아나필락틱 반응(anaphylactic reactions)
 안약(ophthalmic medication)
 알레르기 반응(allergic reactions)
 약동학(pharmacokinetics)
 약물 남용(drug abuse)
 약물 상호작용(drug interaction)
 약물 의존성(drug dependency)
 약물오용(drug misuse)
 역효과(adverse effect)
 의원성 질환(iatrogenic disease)
 정맥 투여(intravenous administration)
 주사(injection)
 처방약(prescription drug)
 축적작용(cumulative effect)
 치료적 효과(therapeutic effect)
 투약(medication)
 투약오류(drug error)
 특이체질 반응(idiosyncratic reactions)
 피내주사(intradermal injection)
 피하주사(subcutaneous injection)
 해독하다(detoxify)
 흡수(absorption)
 흡입(inhalation)
 Z-tract 주사방법(Z-tract injection)

방되는 경우

27-10 투약처방에 자주 사용하는 표준 약어

	약어	라틴어 또는 영어	뜻
ys	ac	ante cibum, before meals	식전
	ad lib	ad libitum, freely, as desired	자유로
	agit	agita, shake, stir	흔들어서, 저어서
	am	ante meridiem, before noon	오전
	aq	aqua, water	물
처방하는 order)이다.	aq dest	aqua distillation, distilled water	증류수
용하여 대상자 해야 한다.	bid	bis in die, twice a day	하루에 두번
시간적 간격 보다 더 빈번	c	cum, with	같이, 함께
처방의 예제	cap	capsule	교감
M q4h prn	comp	compound	혼합물
투약시간을 기록해야 한다. 를 기록한다.	DC	discontinue	중단
하는 약물을 진단검사 전에 처방이 보편화 다음과 같다. 술실에 갈 때 의 약물용량 것을 의미한다. 급상황에 처 하는 다음과	dil	dissolve, dilute	용해, 희석
	elix	elixir	엘리시르
	h	hora, hour	시간
	hs	hora somni, at bedtime	취침시간
	IM	intramuscular	근육 내
	IV	intravenous	정맥 내
	M or m	mix	혼합해서
	no	number	번호, 숫자
	npo	nor par os, nothing by mouth	금식
	non rep	do not repeat	반복하지 말 것
	OD	oculus dexter, right eye	우측 눈
	OS	oculus sinister, left eye	좌측 눈
	OU	oculus uterque, both eyes	양쪽 눈
	pc	post uterque, after meals	식후
	pm	post meridiem, afternoon	오후
	po	par os, by mouth	경구로
	prn	pro re nata, when needed	필요시마다
	q	quaque, every	매, 마다
	qh(q 1h)	quaque hora, every hour	매 1시간마다
	qid	quatre in die, four times a day	하루에 네 번
	qn	quaque nocte, every night	매일 밤마다
	qod	every other day	격일로
	qs	quantum satis, sufficient quantity	충분한 양
	rept	may be repeated	반복해도 됨
	Rx	recipe, take	처방
	s	sine, without	~없이
	sc	subcutaneous	피하
	sos	si opus sit, if it is needed	위급시
	ss or ss	semassis, one half	반(半)
	stat	statim, at once	즉시
	sup or supp	suppository	좌약
	susp	suspension	현탁액
	tid	ter in die, three times a day	하루에 세 번
	Tr or tinct	tinctura, tincture	팅크제