

기관내 흡인(endotracheal suction)					
번호	수행항목	교수평가			피드백
		PASS		FAIL	
		1	2		
1	물과 비누로 손위생을 실시한다.				
2	필요한 물품을 준비한다.				
3	준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다.				
4	손소독제로 손위생을 실시한다.				
5*	대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다.				
6	대상자에게 기관내 흡인의 목적과 절차를 설명한다. (가능하면 식사 전에 흡인을 실시하여 aspiration을 예방하도록 한다.)				
7	흡인압을 점검한다. (성인은 110~150mmHg, 아동은 95~100mmHg)				
8	흡인시 채위는 의식 있는 대상자의 경우 반좌위로 하고, 무의식 대상자는 측위에서 간호사와 얼굴을 마주보도록 한다				
9	무균용기가 들어있는 세트를 열어 용기에 일회용 생리식염수를 따른다. ※참고) 세트를 사용하지 않는 경우 일회용 멸균 생리식염수 30ml를 개봉하여 사용한다.				
10*	카테터의 개봉부위를 약간 개봉한 후 카테터와 흡인병이 연결되는 압력 조절구쪽을 노출하여 흡인 line과 연결한다				
11	손소독제로 손위생을 실시한다.				
12	양손에 멸균장갑을 낀다. (필요에 따라 흡인 전 과한기 실시)				
13	흡인 line을 잡을 손으로 흡인기를 켜 다음 흡인 line을 들고 흡인을 할 손으로 포장지 바깥쪽이 닿지 않도록 주의하며 카테터를 꺼낸다.				
14*	삽입할 카테터의 길이를 정한 후 끝을 생리식염수로 윤활 시키고 흡인 line을 잡은 손의 엄지손가락으로 연결관을 눌러보아 잘 통과하는지 확인한다.				
15*	연결관을 누르고 있던 엄지 손가락을 떼고 나서 인공 기도를 통해 카테터를 부드럽게 삽입한다.				
16*	연결관을 막고 카테터를 잡은 손 엄지와 검지로 카테터를 부드럽게 회전시키면서 위로 뺀다. (분비물 양상과 대상자의 저산소 상태 등을 살피면서 10~15초를 넘지 않도록 신속히 흡인한다).				
17*	흡인을 한 카테터는 무균용기(또는 일회용 멸균 생리 식염수)에 있는 생리식염수를 다시 통과시킨다(분비물이 통과할 때 분비물의 양상을 관찰한다).				
18	분비물이 제거될 때까지 3~4회 같은 방법으로 흡인을 시행하되 20~30초의 간격을 유지한다.				
19	흡인이 끝나면 장갑을 벗고, 흡인기를 끈 다음 사용한 물품을 정리한다.				
20	물과 비누로 손위생을 실시한다.				
21	수행 결과를 간호기록지에 기록한다 1) 날짜와 시간 2) 분비물의 특성, 양 3) 흡인 전 후 대상자의 호흡양상과 반응				
comments 및 총점 : 시행일자 : 2018년 월 일 평가자 : 인					