

번호	수행항목	교수평가			피드백
		PASS		FAIL	
		1	2		
단순 도뇨					
*	태도, 준비, 복장, 머리				
1	물과 비누로 손위생을 실시한다.				
2	필요한 물품을 준비한다.				
3	1) 도뇨 세트를 쟁반(tray)위에 놓고 무균적으로 편다.				
4	2) 도뇨 세트의 종지에 소독솜을 넣고 멸균 윤활제를 세트 내에 짜 넣는다.				
5*	적당한 크기(6~7Fr)의 도뇨관을 무균적으로 세트 속에 넣은 후 세트를 무균적으로 싣는다. *참고) 여자 6~7# / 남자: 7~8#				
6	준비한 물품을 가지고 가서 대상자에게 간호사 자신을 소개한다.				
7	손소독제로 손위생을 실시한다.				
8*	대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다.				
9	대상자에게 단순도뇨를 하는 목적과 절차를 설명한다.				
10	커튼(스크린)으로 대상자의 사생활을 보호해주고, 똑바로 눕도록 한 후 침구(이불 또는 홀이불)을 덮어준다..				
11	방수포(고무포와 반 홀이불)를 대상자 둔부 밑에 깔다.				
12	대상자의 하의를 벗기고 무릎을 굽힌 후 60cm 가량 다리를 벌려 배횡와위(dorsal recumbent position)를 취하도록 도와준다. ※참고) 남자는 똑바로 눕게 하고 회음부만 노출				
13	복부 위로 침구(또는 홀이불)끝을 접어 올려서 회음부를 노출시키고 대상자에게 다리를 움직이지 말라고 설명한다.				
14	세트가 있는 쟁반(tray)과 곡반을 대상자 다리 사이에 놓고 준비한 세트를 연다.				
15	손소독제로 손위생을 실시한다.				
16*	멸균장갑을 무균적으로 착용한다.				
17*	멸균장갑 낀 손이 오염되지 않게 외음부의 노출된 부위를 공포(hole towel)로 덮어 준다.				
18	도뇨관 끝(5cm)에 윤활제를 바르고 소독솜으로 외음부 주위를 닦을 때 찬 느낌이 있을 수 있음을 설명한다.				
19*	소독솜으로 외음부 주위를 닦는다.(한번 닦을 때마다 새 소독솜을 사용하고 닦은 솜은 세트바깥포에 놓는다.)				
20	한손의 엄지와 검지로 음순을 벌려서 요도를 노출 시킨다.				

